

Повторная госпитализация или выход из программы <i>(обвести, указать дату/причину)</i>		Госпитализация Выбыл Причина _____ _____	Госпитализация Выбыл Причина _____ _____	Госпитализация Выбыл Причина _____ _____	Госпитализация Выбыл Причина _____ _____	Госпитализация Выбыл Причина _____ _____												
Другие события, случившиеся после госпитализации																		
Назначения/прием медикаментов*, которые улучшают клинический прогноз (обвести)																		
Инг.АПФ (или сартан)	Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ			
Бета-блокатор	Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ			
Антагонист альдостерона	Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ			
Ивабрадин	Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ			
Антикоагулянт	Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ		Да нет п/показ			
Оценка приверженности пациента рекомендациям (обвести)	высокая	средняя	низкая	высокая	средняя	низкая	высокая	средняя	низкая	высокая	средняя	низкая	высокая	средняя	низкая	высокая	средняя	низкая

* -Инг.АПФ – при ФВ ЛЖ ≤40% (при кашле или аллергии – сартаны)

Бета-блокатор – при ФВ ЛЖ ≤40%

Антагонист альдостерона – при ФВ ЛЖ ≤35% если К+ < 5.0 ммоль/л, а креатинин < 200 мкмоль/л

Ивабрадин – а) если пациент с синусовым ритмом получает бета-блокатор, но ЧСС > 70 уд в мин; б) если бета-блокатор противопоказан

Пероральный антикоагулянт – если пациент с ФП

** ЭхоКГ необходимо проводить как минимум 2 раза за время наблюдения. Если пациент имеет Эхо КГ, выполненную за 3-6 месяцев до начала наблюдения – эти данные могут быть использованы как исходные (и внесены в графу «стационарный» этап), повторное ЭхоКГ исследование – по решению врача, но не позднее визита 5 (12 мес. (+14дн.) после выписки).

Оценка КЖ (баллы)*** - оценка качества жизни по Миннесотскому опроснику качества жизни у пациентов с хронической сердечной недостаточностью